



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה – המועצה לענף הלול

תכנית חיסונים - תרנגולות רביה כבדה

גיל	סוג התרכיב	שיטת החיסון
יום בקיעה	* ניוקסל חי ¹ + ברונכיטיס מדבקת חי מארק ביוולנטי (SB1+HVT) או ריספנס #סלמונלה חי (טיפימוריום או/ו אנטריטידיס) ²	ריסוס/טפטוף לעין הזרקה (או IN OVO ב-18 ימי הדגרה) מי שתיה ראשוניים
5 - 7 יום	ראו חי	הזרקה
6 - 9 יום	קוקצידיוסיס	מי שתיה
10-12 יום	* ניוקסל מומת גמבורו מומת אינפלואנזה מומת (H9N2) ברונכיטיס מדבקת	הזרקה הזרקה הזרקה מי שתיה או ריסוס
17 - 21 יום	*ניוקסל חי	ערפול
4 שבועות	* ניוקסל חי + ברונכיטיס מדבקת חי	ערפול
5-7 שבועות	גמבורו חי #סלמונלה חי (טיפימוריום או/ו אנטריטידיס) אבעבועות ראו חי אינפלואנזה מומת (H9N2)	מי שתיה מי שתיה דקירה הזרקה הזרקה
8-15 שבועות	לרינגוטרכאיטיס #סלמונלה מומת או חי (טיפימוריום או/ו אנטריטידיס) ³ אינפלואנזה מומת (H9N2) (ב-12 שבועות)	מריחה בביב הזרקה או מי שתיה הזרקה
14-16 שבועות	* ניוקסל חי+ברונכיטיס מדבקת חי ראו מומת דלקת מח נגיפית (תרנגולות)	ערפול הזרקה מי שתיה+2% הזלפה לפה
18-22 שבועות	* ניוקסל מומת ברונכיטיס מדבקת מומת גמבורו מומת ראו מומת אבעבועות #סלמונלה מומת או חי (טיפימוריום או/ו אנטריטידיס) ³ אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה הזרקה הזרקה הזרקה דקירה הזרקה או מי שתיה הזרקה

* חיסון חובה

- ❖ יש להשתמש בתרכיבי החיסון, תוך הקפדה על הוראות היצרן הרשומות בתוויות ובדברי ההסבר באריות.
- ❖ חיסון המבוצע בהזרקה, מחייב כי כל בעל כנף יקבל מנה אחת של תרכיב באופן שמנת התרכיב בשלמותה תוזרק לגוף העוף.
- ❖ חיסון בעירפול או ריסוס יבוצע באופן שיבטיח פיזור אחיד של החיסון.
- ❖ חיסון במי שתיה יבוצע בהתאם להוראות תווית האריזה. יש להשתמש במספר מנות המתאים למספר העופות בלהקה.
- ❖ אין להשתמש בתרכיבי חיסון שפג תוקפם (תאריך התפוגה מופיע בכל אריזה).
- ❖ החיסון יבוצע על ידי אחד מהגורמים הבאים בלבד:
 - רופא וטרינר
 - אדם בעל היתר לעסוק בחיסון עופות בהתאם לתקנות הרופאים הווטרינריים (כשירותיות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר-חיסון עופות), תשנ"ד – 1994.
 - בעל העופות ובלבד שקיבל הנחיות מקצועיות לביצוע החיסונים מהשירותים הווטרינריים.
- ❖ חיסוני חובה: על המגדל לדאוג ולקבל את ההוראות הנוגעות לחיסוני החובה, לפני קבלת להקה. חיסוני החובה מסומנים בכל אחת מתכניות החיסונים.
- ❖ כל סטייה מהוראות החיסון תעשה באישור מוקדם של רופא וטרינר ממשלתי למחלות עופות בלבד.

תכנית חיסונים - תרנגולות רביה כבדה (המשך)

גיל	סוג התרכיב	שיטת החיסון
הנשרה	* ניוקסל מומת	הזרקה
	ברונכיטיס מדבקת מומת	הזרקה
	גמבורו מומת	הזרקה
	ראו מומת	הזרקה
	לרינגוטרכאיטיס	מריחה בביב
	אבעבועות	דקירה
	#סלמונלה מומת או חי (טיפימוריום או/ו	הזרקה או מי שתיה
	אנטריטידיס)	מי שתיה +2% הזלפה לפה
	דלקת מח נגיפית (תרנגולות)	הזרקה
	אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה

*חיסון חובה

בלהקות יבוא: ¹ יש לבצע את החיסון מיד עם הגעת הלהקה למשק.

² החיסון הראשון לא לפני גיל 21 יום.

³ תרכיב מומת רק לאחר שחרור הלהקה מהסגר יבוא. ניתן לחסן בתרכיב חי בטרם השחרור.

חיסונים נגד TRT ("מחלת ההודים" APV) ופסטרלה לפי מצב התחלואה במשק.

TRT ("מחלת ההודים" APV) – יש לדאוג למרווח של 7 ימים לפחות מחיסון ניוקסל חי.

בהתאם להוראות היצרן אין לטפל בתכשירים בעלי פעילות אנטי חיידקית בטווח זמן של 3 ימים לפני ואחרי מתן החיסון. במידה והלהקה טופלה יש לחזור על החיסון 3 ימים מתום הטיפול.

❖ יש להשתמש בתרכיבי החיסון, תוך הקפדה על הוראות היצרן הרשומות בתוויות ובדברי ההסבר באריזות.

❖ חיסון המבוצע בהזרקה, מחייב כי כל בעל כנף יקבל מנה אחת של תרכיב באופן שמנת התרכיב בשלמותה תוזרק לגוף העוף.

❖ חיסון בעירפול או ריסוס יבוצע באופן שיבטיח פיזור אחיד של החיסון.

❖ חיסון במי שתיה יבוצע בהתאם להוראות תווית האריזה. יש להשתמש במספר מנות המתאים למספר העופות בלהקה.

❖ אין להשתמש בתרכיבי חיסון שפג תוקפם (תאריך התפוגה מופיע בכל אריזה).

❖ החיסון יבוצע על ידי אחד מהגורמים הבאים בלבד:

○ רופא וטרינר

○ אדם בעל היתר לעסוק בחיסון עופות בהתאם לתקנות הרופאים הווטרינרים (כשירותיות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר-חיסון עופות), תשנ"ד – 1994.

○ בעל העופות ובלבד שקיבל הנחיות מקצועיות לביצוע החיסונים מהשירותים הווטרינריים.

❖ חיסוני חובה: על המגדל לדאוג ולקבל את ההוראות הנוגעות לחיסוני החובה, לפני קבלת להקה. חיסוני החובה מסומנים בכל אחת מתכניות החיסונים.

❖ כל סטייה מהוראות החיסון תעשה באישור מוקדם של רופא וטרינר ממשלתי למחלות עופות בלבד.