



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה – המועצה לענף הלול

תכנית חיסונים - יענים

גיל	סוג התרכיב	שיטת החיסון
14 יום	ניוקסל חי ניוקסל מומת אבעבועות	טפטוף לעין- מנה הזרקה- מנה דקירה
4 – 5 שבועות	ניוקסל מומת ניוקסל חי אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה- 4 מנות ריסוס – 10 מנות הזרקה -2 מנות
3 חודשים	ניוקסל מומת ניוקסל חי אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה- 6 מנות ריסוס – 10 מנות הזרקה 4 מנות
6 חודשים	ניוקסל מומת	הזרקה- 8 מנות
1 שנה*	ניוקסל מומת אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה- 10 מנות הזרקה – 4 מנות
מדי שנה (רביה)	ניוקסל מומת ניוקסל חי אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה- 10 מנות ריסוס – 10 מנות הזרקה – 4 מנות

כל החיסונים נגד ניוקסל הם חובה.

אין לחסן בתרכיב ניוקסל חי 30 יום לפני השחיטה.

* : ביענים מיועדות לרביה, לשלב תרכיב ניוקסל חי בריסוס – 10 מנות.

- ❖ יש להשתמש בתרכיבי החיסון, תוך הקפדה על הוראות היצרן הרשומות בתוויות ובדברי ההסבר באריזות.
- ❖ חיסון המבוצע בהזרקה, מחייב כי כל בעל כנף יקבל מנה אחת של תרכיב באופן שמנת התרכיב בשלמותה תוזרק לגוף העוף.
- ❖ חיסון בעירפול או ריסוס יבוצע באופן שיבטיח פיזור אחיד של החיסון.
- ❖ חיסון במי שתייה יבוצע בהתאם להוראות תווית האריזה. יש להשתמש במספר מנות המתאים למספר העופות בלהקה.
- ❖ אין להשתמש בתרכיבי חיסון שפג תוקפם (תאריך התפוגה מופיע בכל אריזה).
- ❖ החיסון יבוצע על ידי אחד מהגורמים הבאים בלבד :
 - רופא וטרינר
 - אדם בעל היתר לעסוק בחיסון עופות בהתאם לתקנות הרופאים הווטרינרים (כשירותיות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר-חיסון עופות), תשנ"ד – 1994.
 - בעל העופות ובלבד שקיבל הנחיות מקצועיות לביצוע החיסונים מהשירותים הווטרינריים.
- ❖ חיסוני חובה : על המגדל לדאוג ולקבל את ההוראות הנוגעות לחיסוני החובה, לפני קבלת להקה. חיסוני החובה מסומנים בכל אחת מתכניות החיסונים.
- ❖ כל סטייה מהוראות החיסון תעשה באישור מוקדם של רופא וטרינר ממשלתי למחלות עופות בלבד.