



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה – המועצה לענף הלול

תוכנית חיסונים – אוזים לרבייה ולבשר

גיל	סוג התרכיב	שיטת החיסון
בבקיעה	ניוקסל חי ¹	טיפטוף לעיניים
1 יום	סלמונלה חי (טיפימוריום או/ו אנטריטידיס) ⁴	מי שתיה ראשונים
14 יום	קדחת מערב הנילוס מומת ¹ ניוקסל מומת ¹	הזרקה הזרקה
3 שבועות	פסטרלה מולטוצידה + רימרלה אנטיפסטיפר מומת ורדת מומת	הזרקה הזרקה
4 שבועות	קדחת מערב הנילוס מומת ¹ ניוקסל מומת ¹	הזרקה הזרקה
5 - 7 שבועות	פסטרלה מולטוצידה + רימרלה אנטיפסטיפר מומת ורדת מומת סלמונלה חי (טיפימוריום או/ו אנטריטידיס)	הזרקה הזרקה מי שתיה
5 חודשים	דלקת כבד נגיפית חי ² פסטרלה מולטוצידה + רימרלה אנטיפסטיפר מומת ורדת מומת	הזרקה הזרקה הזרקה
6 - 7 חודשים	דלקת כבד נגיפית חי ³ ניוקסל מומת ¹ פסטרלה מולטוצידה + רימרלה אנטיפסטיפר מומת ורדת מומת סלמונלה מומת או חי (טיפימוריום או/ו אנטריטידיס) ⁵	הזרקה הזרקה הזרקה הזרקה הזרקה או מי שתיה
הנשרה	דלקת כבד נגיפית חי ³ ניוקסל מומת ¹ פסטרלה מולטוצידה + רימרלה אנטיפסטיפר מומת ורדת מומת סלמונלה מומת או חי (טיפימוריום או/ו אנטריטידיס)	הזרקה הזרקה הזרקה הזרקה הזרקה או מי שתיה

¹ חיסון חובה

- ❖ יש להשתמש בתרכיבי החיסון, תוך הקפדה על הוראות היצרן הרשומות בתוויות ובדברי ההסבר באריות.
- ❖ חיסון המבוצע בהזרקה, מחייב כי כל בעל כנף יקבל מנה אחת של תרכיב באופן שמנת התרכיב בשלמותה תוזרק לגוף העוף.
- ❖ חיסון בעירפול או ריסוס יבוצע באופן שיבטיח פיזור אחיד של החיסון.
- ❖ חיסון במי שתיה יבוצע בהתאם להוראות תווית האריזה. יש להשתמש במספר מנות המתאים למספר העופות בלהקה.
- ❖ אין להשתמש בתרכיבי חיסון שפג תוקפם (תאריך התפוגה מופיע בכל אריזה).
- ❖ החיסון יבוצע על ידי אחד מהגורמים הבאים בלבד:
 - רופא וטרינר
 - אדם בעל היתר לעסוק בחיסון עופות בהתאם לתקנות הרפואים הווטרינריים (כשירותיות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר-חיסון עופות), תשנ"ד – 1994.
 - בעל העופות ובלבד שקיבל הנחיות מקצועיות לביצוע החיסונים מהשירותים הווטרינריים.
- ❖ חיסוני חובה: על המגדל לדאוג ולקבל את ההוראות הנוגעות לחיסוני החובה, לפני קבלת להקה. חיסוני החובה מסומנים בכל אחת מתכניות החיסונים.
- ❖ כל סטייה מהוראות החיסון תעשה באישור מוקדם של רופא וטרינר ממשלתי למחלות עופות בלבד.

תוכנית חיסונים – אוזנים לרביה ולבשר (המשך)

² כחודשיים לפני כניסה להטלה

³ לפחות חודש לפני כניסה להטלה

בלהקות יבוא : ⁴ החיסון הראשון לא לפני גיל 21 יום.

⁵ תרכיב מומת רק לאחר שחרור הלהקה מהסגר יבוא. ניתן לחסן בתרכיב חי

בטרם השחרור.

בלהקות אוזנים לבשר : החיסונים (חובה) בתרכיב קדחת מערב הנילוס הם עונתיים (מאי-

נובמבר).

- ❖ יש להשתמש בתרכיבי החיסון, תוך הקפדה על הוראות היצרן הרשומות בתוויות ובדברי ההסבר באריזות.
- ❖ חיסון המבוצע בהזרקה, מחייב כי כל בעל כנף יקבל מנה אחת של תרכיב באופן שמנת התרכיב בשלמותה תוזרק לגוף העוף.
- ❖ חיסון בעירפול או ריסוס יבוצע באופן שיבטיח פיזור אחיד של החיסון.
- ❖ חיסון במי שתייה יבוצע בהתאם להוראות תווית האריזה. יש להשתמש במספר מנות המתאים למספר העופות בלהקה.
- ❖ אין להשתמש בתרכיבי חיסון שפג תוקפם (תאריך התפוגה מופיע בכל אריזה).
- ❖ החיסון יבוצע על ידי אחד מהגורמים הבאים בלבד :
 - רופא וטרינר
 - אדם בעל היתר לעסוק בחיסון עופות בהתאם לתקנות הרופאים הווטרינרים (כשירותיות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר-חיסון עופות), תשנ"ד – 1994.
 - בעל העופות ובלבד שקיבל הנחיות מקצועיות לביצוע החיסונים מהשירותים הווטרינריים.
- ❖ חיסוני חובה : על המגדל לדאוג ולקבל את ההוראות הנוגעות לחיסוני החובה, לפני קבלת להקה. חיסוני החובה מסומנים בכל אחת מתכניות החיסונים.
- ❖ כל סטייה מהוראות החיסון תעשה באישור מוקדם של רופא וטרינר ממשלתי למחלות עופות בלבד.