



**מדינת ישראל**  
**משרד החקלאות ופיתוח הכפר**  
**השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה – המועצה לענף הלול**

**תכנית חיסונים - תרנגולי הודו רביה**

גיל	סוג התרכיב	שיטת החיסון
10-0 יום	TRT ("מחלת ההודים" APV) חי	ריסוס/טפטוף לעין/מי שתיה
1 יום	סלמונלה חי (טיפימוריום או/ו אנטריטידיס) <sup>1</sup>	מי שתיה ראשוניים
0-7 יום	* ניוקסל חי	ריסוס/טפטוף לעין/מי שתיה
12 – 14 יום	אינפלואנזה מומת (H9N2) * ניוקסל מומת + דלקת מעיים דמית מומת	הזרקה
3 שבועות	נזלת מדבקת (TRT) חי	ריסוס/טפטוף לעין/מי שתיה
5-6 שבועות	* ניוקסל מומת אבעבועות סלמונלה חי (טיפימוריום או/ו אנטריטידיס) אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה דקירה מי שתיה הזרקה
6-10 שבועות	דלקת מח נגיפית (תרנגולי הודו)	הזרקה
14 שבועות	*ניוקסל חי (או מומת) פסטרלה מולטוצידה+רימרלה אנטיפסטיפר מומת ORT מומת אינפלואנזה מומת (H9N2)	ריסוס/טפטוף לעין (או הזרקה) הזרקה הזרקה הזרקה
9-20 שבועות	דלקת מח נגיפית (תרנגולות)	מי שתיה + 2% הזלפה לפה
20-24 שבועות	דלקת מח נגיפית (תרנגולות) סלמונלה מומת או חי <sup>2</sup> (טיפימוריום או/ו אנטריטידיס)	מי שתיה + 2% הזלפה לפה הזרקה או מי שתיה
22 – 24 שבועות	*ניוקסל מומת דלקת מעיים דמית מומת אינפלואנזה מומת (H9N2) דלקת מח נגיפית (תרנגולי הודו) פסטרלה מולטוצידה+רימרלה אנטיפסטיפר מומת ORT מומת דלקת מח נגיפית (תרנגולות)	הזרקה הזרקה הזרקה הזרקה הזרקה מי שתיה + 2% הזלפה לפה

\*חיסון חובה

- ❖ יש להשתמש בתרכיבי החיסון, תוך הקפדה על הוראות היצרן הרשומות בתוויות ובדברי ההסבר באריות.
- ❖ חיסון המבוצע בהזרקה, מחייב כי כל בעל כנף יקבל מנה אחת של תרכיב באופן שמנת התרכיב בשלמותה תוזרק לגוף העוף.
- ❖ חיסון בעירפול או ריסוס יבוצע באופן שיבטיח פיזור אחיד של החיסון.
- ❖ חיסון במי שתיה יבוצע בהתאם להוראות תווית האריזה. יש להשתמש במספר מנות המתאים למספר העופות בלהקה.
- ❖ אין להשתמש בתרכיבי חיסון שפג תוקפם (תאריך התפוגה מופיע בכל אריזה).
- ❖ החיסון יבוצע על ידי אחד מהגורמים הבאים בלבד:
  - רופא וטרינר
  - אדם בעל היתר לעסוק בחיסון עופות בהתאם לתקנות הרופאים הווטרינרים (כשירותיות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר-חיסון עופות), תשנ"ד – 1994.
  - בעל העופות ובלבד שקיבל הנחיות מקצועיות לביצוע החיסונים מהשירותים הווטרינריים.
- ❖ חיסוני חובה: על המגדל לדאוג ולקבל את ההוראות הנוגעות לחיסוני החובה, לפני קבלת להקה. חיסוני החובה מסומנים בכל אחת מתכניות החיסונים.
- ❖ כל סטייה מהוראות החיסון תעשה באישור מוקדם של רופא וטרינר ממשלתי למחלות עופות בלבד.

## תכנית חיסונים - תרנגולי הודו רביה (המשך)

גיל	סוג התרכיב	שיטת החיסון
27 – 28 שבועות	פסטרה מולטוצידה+רימרלה אנטיפסטיפר מומת ORT מומת אינפלואנזה מומת (H9N2) *ניוקסל מומת אבעבועות נזלת מדבקת ( TRT ) חי או מומת	הזרקה הזרקה הזרקה הזרקה דקירה ערפול או הזרקה
24-30 שבועות	ורדת מומת	הזרקה (זכרים)
<b><u>הנשרה</u></b>		
	סוג התרכיב	שיטת החיסון
	* ניוקסל מומת דלקת מח נגיפית (תרנגולי הודו) אבעבועות סלמונלה מומת או חי (טיפימוריום או/ו אנטריטידיס) ורדת מומת פסטרה מולטוצידה+ אנטיפסטיפר מומת דלקת מח נגיפית (תרנגולות) אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה הזרקה דקירה הזרקה או מי שתיה הזרקה (זכרים) הזרקה מי שתיה + 2% הזלפה לפה הזרקה

\* חיסון חובה

בלהקות יבוא :

<sup>1</sup>החיסון הראשון לא לפני גיל 21 יום.

<sup>2</sup>תרכיב מומת רק לאחר שחרור הלהקה מהסגר יבוא. ניתן לחסן בתרכיב חיבטרם השחרור.

TRT ("מחלת ההודים" APV) : יש לדאוג למרווח של 7 ימים לפחות מחיסון ניוקסל חי.

❖ יש להשתמש בתרכיבי החיסון, תוך הקפדה על הוראות היצרן הרשומות בתוויות ובדברי ההסבר באריזות.

❖ חיסון המבוצע בהזרקה, מחייב כי כל בעל כנף יקבל מנה אחת של תרכיב באופן שמנת התרכיב בשלמותה תוזרק לגוף העוף.

❖ חיסון בעירפול או ריסוס יבוצע באופן שיבטיח פיזור אחיד של החיסון.

❖ חיסון במי שתיה יבוצע בהתאם להוראות תווית האריזה. יש להשתמש במספר מנות המתאים למספר העופות בלהקה.

❖ אין להשתמש בתרכיבי חיסון שפג תוקפם (תאריך התפוגה מופיע בכל אריזה).

❖ החיסון יבוצע על ידי אחד מהגורמים הבאים בלבד :

○ רופא וטרינר

○ אדם בעל היתר לעסוק בחיסון עופות בהתאם לתקנות הרופאים הווטרינרים (כשירות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר-חיסון עופות), תשנ"ד – 1994.

○ בעל העופות ובלבד שקיבל הנחיות מקצועיות לביצוע החיסונים מהשירותים הווטרינריים.

❖ חיסוני חובה : על המגדל לדאוג ולקבל את ההוראות הנוגעות לחיסוני החובה, לפני קבלת להקה. חיסוני החובה מסומנים בכל אחת מתכניות החיסונים.

❖ כל סטייה מהוראות החיסון תעשה באישור מוקדם של רופא וטרינר ממשלתי למחלות עופות בלבד.