



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה – המועצה לענף הלול

תכנית חיסונים - תרנגולות רביה קלה

גיל	סוג התרכיב	שיטת החיסון
יום בקיעה	* ניוקסל חי ¹ + ברונכיטיס מדבקת חי מארק ביוולנטי (SB1+HVT) או ריספנס #סלמונלה חי (טיפימוריום או/ו אנטריטידיס) ²	ריסוס / טפטוף לעין הזרקה מי שתיה ראשוניים
6 – 9 יום	קוקצידיויסיס	ריסוס
10-12 יום	* ניוקסל מומת אינפלואנזה מומת (H9N2) ברונכיטיס מדבקת חי	הזרקה הזרקה מי שתיה או ריסוס
10-21 יום	גמבורו מומת או חי אבעבועות	הזרקה או מי שתיה דקירה
17 – 21 יום	* ניוקסל חי	ערפול
4 שבועות	* ניוקסל חי+ ברונכיטיס מדבקת חי	ערפול
5 – 7 שבועות	#סלמונלה חי (טיפימוריום או/ו אנטריטידיס) אינפלואנזה מומת (H9N2)	מי שתיה הזרקה
7 - 9 שבועות	גמבורו חי נזלת מדבקת מומת	מי שתיה הזרקה
10 - 11 שבועות	דלקת מח נגיפית (תרנגולות) * ניוקסל חי	מי שתיה+2% הזלפה לפה ערפול
9 - 13 שבועות	נזלת מדבקת מומת אינפלואנזה מומת (H9N2) אבעבועות לרינגוטרכאיטיס	הזרקה הזרקה דקירה מריחה בביב
14 - 17 שבועות	* ניוקסל מומת+ ברונכיטיס מדבקת מומת גמבורו מומת (אין צורך בזכרים)	הזרקה הזרקה
17 - 18 שבועות	#סלמונלה מומת או חי (טיפימוריום או/ו נטריטידיס) ³ *ניוקסל חי	הזרקה או מי שתיה ערפול

* חיסון חובה

- ❖ יש להשתמש בתרכיבי החיסון, תוך הקפדה על הוראות היצרן הרשומות בתוויות ובדברי ההסבר באריות.
- ❖ חיסון המבוצע בהזרקה, מחייב כי כל בעל כנף יקבל מנה אחת של תרכיב באופן שמנת התרכיב בשלמותה תוזרק לגוף העוף.
- ❖ חיסון בעירפול או ריסוס יבוצע באופן שיבטיח פיזור אחיד של החיסון.
- ❖ חיסון במי שתיה יבוצע בהתאם להוראות תווית האריזה. יש להשתמש במספר מנות המתאים למספר העופות בלהקה.
- ❖ אין להשתמש בתרכיבי חיסון שפג תוקפם (תאריך התפוגה מופיע בכל אריזה).
- ❖ החיסון יבוצע על ידי אחד מהגורמים הבאים בלבד:
 - רופא וטרינר
 - אדם בעל היתר לעסוק בחיסון עופות בהתאם לתקנות הרופאים הווטרינרים (כשירותיות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר-חיסון עופות), תשנ"ד – 1994.
 - בעל העופות ובלבד שקיבל הנחיות מקצועיות לביצוע החיסונים מהשירותים הווטרינריים.
- ❖ חיסוני חובה: על המגדל לדאוג ולקבל את ההוראות הנוגעות לחיסוני החובה, לפני קבלת להקה. חיסוני החובה מסומנים בכל אחת מתכניות החיסונים.
- ❖ כל סטייה מהוראות החיסון תעשה באישור מוקדם של רופא וטרינר ממשלתי למחלות עופות בלבד.

שם הוראת העבודה: הנחיות כלליות למתן היתר להפעלת משק	מס' הוראת טופס: טהע- 04.08	עדכון מס': 3	בתוקף מ: 03/03/10
---	----------------------------	--------------	-------------------

תכנית חיסונים - תרנגולות רביה קלה (המשך)

גיל	סוג התרכיב	שיטת החיסון
הנשרה	* ניוקסל מומת	הזרקה
	ברונכיטיס מדבקת מומת	הזרקה
	גמבורו מומת	הזרקה
	לרינגוטרקאיטיס	מריחה בביב
	אבעבועות	דקירה
	#סלמונלה מומת או חי (טיפימוריום או/ו אנטריטידיס)	הזרקה או מי שתיה
	דלקת מח נגיפית (תרנגולות) אינפלואנזה מומת (H9N2)	מי שתיה + 2% הזלפה לפה הזרקה

* חיסון חובה

- בלהקות יבוא: ¹ יש לבצע את החיסון מיד עם הגעת הלהקה למשק.
² החיסון הראשון לא לפני גיל 21 יום.
³ תרכיב מומת רק לאחר שחרור הלהקה מהסגר יבוא. ניתן לחסן בתרכיב חי בטרם השחרור.

בהתאם להוראות היצרן אין לטפל בתכשירים בעלי פעילות אנטי חיידקית בטווח זמן של 3 ימים לפני ואחרי מתן החיסון. במידה והלהקה טופלה יש לחזור על החיסון 3 ימים מתום הטיפול.

- ❖ יש להשתמש בתרכיבי החיסון, תוך הקפדה על הוראות היצרן הרשומות בתוויות ובדברי החסבר באריזות.
- ❖ חיסון המבוצע בהזרקה, מחייב כי כל בעל כנף יקבל מנה אחת של תרכיב באופן שמנת התרכיב בשלמותה תוזרק לגוף העוף.
- ❖ חיסון בעירפול או ריסוס יבוצע באופן שיבטיח פיזור אחיד של החיסון.
- ❖ חיסון במי שתיה יבוצע בהתאם להוראות תווית האריזה. יש להשתמש במספר מנות המתאים למספר העופות בלהקה.
- ❖ אין להשתמש בתרכיבי חיסון שפג תוקפם (תאריך התפוגה מופיע בכל אריזה).
- ❖ החיסון יבוצע על ידי אחד מהגורמים הבאים בלבד:
 - רופא וטרינר
 - אדם בעל היתר לעסוק בחיסון עופות בהתאם לתקנות הרופאים הווטרינרים (כשירותיות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר-חיסון עופות), תשנ"ד – 1994.
 - בעל העופות ובלבד שקיבל הנחיות מקצועיות לביצוע החיסונים מהשירותים הווטרינריים.
- ❖ חיסוני חובה: על המגדל לדאוג ולקבל את ההוראות הנוגעות לחיסוני החובה, לפני קבלת להקה. חיסוני החובה מסומנים בכל אחת מתכניות החיסונים.
- ❖ כל סטייה מהוראות החיסון תעשה באישור מוקדם של רופא וטרינר ממשלתי למחלות עופות בלבד.